

Профилактическая программа «Тромбоцитопения, индуцированная химиотерапией! Выход есть!»

Центр персонализированной фармации «Хемотека» при поддержке корпорации «ЮРiЯ-ФАРМ» анонсировал проведение профилактической программы – «Тромбоцитопения, индуцированная химиотерапией! Выход есть!».

Приобретая химиотерапевтические лекарственные средства в [Центре персонализированной фармации «Хемотека»](#), которые вероятно могут вызвать тромбоцитопению (см. список ниже), пациент имеет возможность БЕЗОПЛАТНО получить 4 флакона препарата Эмаплаг®. Целью применения является возможность избежать развития тромбоцитопении, т.е. профилактировать её.

При заказе ХТ лекарственных средств на 1 цикл ХТ лечения, пациент получает 4 флакона Эмаплага®.

При заказе ХТ лекарственных средств на несколько циклов, пациент получает 4 флакона Эмаплага® на каждый цикл.

Период действия программы – до 31 декабря 2018 года.

Список ХТ препаратов, которые могут вызвать тромбоцитопению:

№	Международное непатентованное название	Частота тромбоцитопении I-IV степени при применении в схемах химиотерапии, %	Когда возникает nadir (минимальный уровень) тромбоцитов
1	Гемцитабин	64,4	15 день
2	Паклитаксел	59,3	8-9 день
3	Карбоплатин	58,2	14-21 день
4	Оксалиплатин	37,5	10 день
5	Этопозид	36,9	9-16 день
6	Ифосфамид	35,7	7-14 день
7	Цисплатин	33,6	21 день
8	Доксорубицин	19,4	10-14 день
9	5-Фторурацил	17,5	7-17 день
10	Циклофосфамид	13	7-14 день