

## Профілактична програма «Тромбоцитопенія, індукована хіміотерапією!

### Вихід є!»

Центр персоналізованої фармації «Хемотека» за підтримки корпорації «ЮРІЯ-ФАРМ» анонсував проведення профілактичної програми – «Тромбоцитопенія, індукована хіміотерапією! Вихід є!».

Купуючи хіміотерапевтичні лікарські засоби в [Центрі персоналізованої фармації «Хемотека»](#), які ймовірно можуть викликати тромбоцитопенію (див. список нижче), пацієнт має можливість безоплатного отримати 4 флакони препарату Емаплаг®. Метою застосування є можливість уникнути розвитку тромбоцитопенії, тобто профілактикувати її.

При замовленні ХТ лікарських засобів на 1 цикл ХТ лікування, пацієнт отримує 4 флакони Емаплагу®.

При замовленні ХТ лікарських засобів на кілька циклів, пацієнт отримує 4 флакони Емаплагу® на кожен цикл.

**Період дії програми** – до 31 грудня 2018 року.

Список ХТ препаратів, які можуть викликати тромбоцитопенію:

№	Міжнародна непатентована назва	Частота тромбоцитопеній I-IV ступеня при застосуванні в схемах хіміотерапії, %	Коли виникає надир (мінімальний рівень) тромбоцитів
1	Гемцитабін	64,4	15 день
2	Паклітаксел	59,3	8-9 день
3	Карбоплатин	58,2	14-21 день
4	Оксаліплатин	37,5	10 день
5	Етопозид	36,9	9-16 день
6	Іфосфамід	35,7	7-14 день
7	Цисплатин	33,6	21 день
8	Доксорубіцин	19,4	10-14 день
9	5-Фторурацил	17,5	7-17 день
10	Циклофосфамід	13	7-14 день